

Nr. 263 din 19.06.2026

BULETIN DE AVERTIZARE**Nr. 42 / 19.06 /2026**

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare:
Păduchele din San Jose (*Quadraspidiotus perniciosus*) tr. I, gen.I.

Aplicați tratamente chimice la toate speciile pomicole pentru combaterea acestui dăunător, considerat unul din cei mai periculoși dușmani ai pomilor fructiferi.


Ramurile atacate de acest dăunător, se recunosc după petele circulare de culoare roșie-vișinie.

Ramurile încep să se usuce de la vârf.


Atacul pe fructe este des întâlnit, sub formă de pete roșii -vișinii, circulare, larvele fiind frecvent localizate în zona caliciului și a pedunculului.

Larvele păduchelui din San Jose de la fiecare generație, (1 - 3 generații /an) după depunere, au o perioadă de 3 - 4 zile când migrează pe scoarța tulpinii, pe ramuri, lăstari, frunze și fructe, până își formează scutul protector, perioadă când sunt cel mai sensibile la efectul insecticidelor.

Pentru tratament vă recomandăm unul dintre următoarele produse:



Deltagri / Faster Delta	Specii pomicole	Paduchele din San Jose	0,3 - 0,45 l/ha	TP - 7 zile
Juvinal 10 EC	Specii pomicole	Paduchele din San Jose	0,05 – 0,075 % (50–75 ml/hl apă)	TP – 3 zile
Mospilan 20 SG/Krima 20 SG	Specii pomicole	Paduchele din San Jose	0,375 - 0,450 kg/ha (0,025-0,03%)	TP - 14 zil
Poleci / Deca 2,5 EC	Specii pomicole	Paduchele din San Jose	50-75 ml/hl apa (0,05-0,075 %)	TP - 3 zile



Prin acest tratament se va insista mult și asupra organelor lemnoase ale pomilor și a fructelor.

Apariția foarte eșalonată a dăunătorului, impune **repetarea tratamentului la 10 - 12 zile.**

Prin acest tratament sunt vizați și alți dăunători ai pomilor.

Contra bolilor foliare vă recomandăm să adăugați în soluție și un fungicid, după cum urmează:

La măr și păr și alte semîntoase

Varianta I: un produs care combate rapănul și făinarea:

BELLIS - 0,8 kg/ha sau **DOMARK 10 EC** - 0,4 l/ha (0,027 %) sau **LUNA EXPERIENCE 400 SC** - 0,75 l/ha sau **MOLINA** - 0,4 l/ha sau **FOLICUR SOLO 250 EW** – 0,6 l/ha.

Varianta II: un fungicid care combate rapanul: **BATALION 450 SC/GLADIUS 450 SC** –0,7-1,0 l/ha sau **CAPTAN 80 WDG /CAPTADIN** – 0,15% (2,250 kg/ha) sau **INTEREST 25 EC (DIFENZONE 25 EC)** - 0,2 l/ha, la care se adaugă ur fungicid pentru combaterea făinării: **CYFLAMID 5 EW**- 0,45 l/ha sau **KUMULUS DF** - 0.3% sau **TOPAS 100 EC** - 0,02 % (0,3 l/ha) sau **TEBUSTAR EW /MYSTIC TOP** - 0,05%.

La prun și alte sâmburoase (pătarea roșie, ciurui, monilioze, etc) se adaugă: **VITRA 50 WP (CUPRIDIN)** - 1,5 - 2,0 kg/ha sau **LUNA EXPERIENCE 400 SC** - 0,5 l/ha (-0,05%) sau **FOLPAN 80 WDG (FLOVINE)** - 0,2 %.

În prealabil efectuați testul de compatibilitate. Citiți cu atenție toate instrucțiunile înscrise pe ambalaj.

Pentru tratament se pot folosi și alte ppp, cu efect similar, omologate pentru a fi utilizate în România.

Tratamentele se efectuează la temperaturi sub 23° C (dimineata și seara).

Nu se tratează chimic pomii a căror fructe sunt în faza de pârgă - coacere iar unde se tratează în mod accidental legume, etc., se respectă **timpul de pauză** până la consum în funcție de remanența ppp. utilizat.

La prepararea soluției se vor respecta concentrațiile și dozele recomandate și se vor citi cu atenție toate instrucțiunile înscrise pe ambalaj.

Volumul mediu de soluție (l/ha) aplicat cu utilaje terestre în pomicultură este la măr, cireș, vișin, nuc 1500 l/ha iar la păr, gutui, prun, cais, piersic, nectarin, arbuști fructiferi, căpșuni, pepiniere pomicole 1000 l/ha.

Folositi pentru tratamentele dintr-un sezon produse din grupe chimice diferite (sau cu mod de actiune diferit) pentru a evita aparitia formelor de rezistență la un anumit produs.

Alte recomandari: Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu ppp, cele de securitate a muncii, de protectie a animalelor si familiilor de albine in conformitate cu: Legea Apiculturii nr. 383/2013, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul 127/1991 al ACA din Romania, Ordinul comun nr. 45/1991 al MAA, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/ TB/ 1991 al Ministerului Transporturilor precum cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.

Respectati prevederile Ordinului MADR, nr 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practice pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor. Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinelui MADR, Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si al presedintelui ANSVSA nr. 352/636/542015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare

Conform prevederilor legale prevazute in: Reg.(CE) nr.1107/2009; H.G nr.1559/2012; O.G nr.4/1995; OG nr.41/2007; OM 352/2015. Respectarea cerintelor SMR 7 – Fermierii care prin activitatea lor, depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza ppp au urmatoarele obligatii: Sa utilizeze numai produse de protectie a plantelor omologate in Comisia Nationala de Omologare a ppp, care se regasesc in baza de date PEST EXPERT. Referinte: <https://www.madr.ro/ro/fitosanitar> Sa utilizeze ppp numai in scopul pentru care acestea au fost omologate si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare dupa eticheta produsului; Sa pastreze pe o perioada de 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp depozitate si utilizate in exploatare, precum si Registrul de evidenta a tratamentelor fitosanitare cu ppp. 1

ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare Nume si prenume fermier/ soc. comercială... Domiciliu fermier/ sediul social al societății (Comuna, județul)Ferma (nume/număr, adresa) ...

REGISTRU de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor.

Data efectuării tratament	Culturașilodeluceeste situatere nul	Tipul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele persoanei responsabile pentru efectuare atamentului. Semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr și data doc prin care s-a dat in consum populației
			Agenti de dăunarecombătuți Boli / dăunători/ buruieni	Denumire produs de protecție a plantelor folosit	Doza :		Supra-fața (ha)			
					Omologată	Folosită		Cantități utilizate (kg/litri)		

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)) Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății. Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regu (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i), (I) Constituie contravenții urmatoarele fapte: i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza" (se sancționeaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei). IN ATENTIA FERMIERILOR !!! Respectarea conditiilor de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatarele agricole, conform Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a produselor de protectia plantelor, elaborat de AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA.

Pentru mai multe detalii accesati: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.

Coordonator,
Dr ing. Cristea Olga



Intocmit,
Ing. Boșoga Vasile

